

CRYPTOCÉPHALIDES DE MADAGASCAR,

PAR M. M. PIC.

(1^{re} Partie.)

Les *Cryptocephalus* Geof. nouveaux décrits ci-dessous font tous partie des collections du Muséum de Paris; les *Cr. submarginatus*, *triluteomaculatus*, *Decorsei* et *multiundulatus* figurent en outre dans ma collection.

***Cryptocephalus ocellaris* nov. sp.**

Oblongus, postice attenuatus, nitidus, nigro-viridescens, antennis ad basin testaceis.

Oblong, atténué postérieurement, brillant, noir-verdâtre avec la base des antennes testacée. Tête ponctuée, ornée de poils blancs, plus denses au-dessus des antennes, yeux grands, assez rapprochés sur le front; antennes longues et grêles; prothorax court, rétréci en avant, finement ponctué; écusson large et court; élytres relativement courts, à rangées de points médiocres, sans stries appréciables, faiblement impressionnés antérieurement; pattes pas très robustes, à pubescence blanche ainsi que le dessous du corps, les côtés de la poitrine étant plus densément pubescents. Long. 4 millim.

De la collection Perrier, sans localité indiquée.

Cette espèce peut se placer près de *C. euchlorus* Dohrn; elle est caractérisée par ses yeux rapprochés et son dessus un peu verdâtre, sans être métallique.

***Cryptocephalus submarginatus* nov. sp.**

Oblongus, postice satis attenuatus ♂, nitidus, niger, elytris apice minute rufo cinctis, antennis ab basin pedibusque testaceis.

Oblong, plus nettement atténué à l'extrémité chez ♂ que chez ♀, brillant avec une très étroite bordure postérieure, roussâtre, base des antennes et pattes testacées. Tête ponctuée, subsillonnée au milieu, ornée de poils blancs, yeux plus rapprochés chez ♂ que chez ♀; antennes grêles, très longues; prothorax assez court, très rétréci en avant, peu ponctué;

écusson assez grand et large; élytres relativement courts, à rangées de points en partie petits, sans stries nettes, à intervalles larges, impressionnés antérieurement; pattes et dessous du corps pubescents de blanc, les côtés de la poitrine l'étant plus densément; pattes peu robustes. Long. 5-7 millim.

Mahajamba : Région de l'Androï (D^r J. Decorse, déc. 99).

Voisin de *C. obscuripes* Frm., pattes plus claires, forme du corps moins ramassée, etc.

***Cryptocephalus conifer* nov. sp.**

Robustus, postice attenuatus, nitidus, nigro-cyanescens, thorace rufo, antennis nigris, ad basin infra rufis.

Robuste, atténué postérieurement, brillant, noir-bleuâtre surtout sur le dessous, prothorax roux. Tête ponctuée, impressionnée entre les yeux qui sont écartés, labre marqué de roux; antennes grêles, sans être filiformes, pas très longues; prothorax lisse, assez court, rétréci en avant, impressionné de chaque côté sur la base avec la partie médiane saillante en gibbosité au-dessus de l'écusson; écusson long, bordé d'un repli; élytres courts, à rangées de points fins, sans stries apparentes, intervalles larges, épaules très marquées; dessous pubescent de gris, plus densément sur les côtés de la poitrine; pattes longues et assez grêles. Long. 8 millim.

Imanombos, oct. 1900 (D^r J. Decorse).

Voisin de *C. robustissimus* Pic, un peu moins trapu et coloration particulière.

***Cryptocephalus atropectoralis* nov. sp.**

Curtus, sat latus, nitidus, rufo-testaceus, antennis apice, scutello, pectore, tibiis apice tarsisque nigris, elytris viridi-metallicis.

Court et assez large, brillant, roux-testacée avec l'écusson, la poitrine et partie des membres noirs, élytres verts. Tête peu ponctuée; antennes grêles et assez longues; prothorax assez court, rétréci en avant, finement ponctué; élytres courts, à rangées de points médians, sans stries appréciables, épaules bien marquées; dessous du corps pubescent de blanc; pattes assez grêles. Long. 5-6 millim.

Ambovambé, novembre 1900 (D^r J. Decorse).

Voisin de *C. mediator* Frm., plus robuste et distinct en partie par la poitrine noire, les pattes bicolores.

Cryptocephalus Decorsei nov. sp.

Satis robustus, postice attenuatus, nitidus, niger, supra luteus, punctis brunneis et signaturis brunneis aut nigris diverse notatus.

Assez robuste, atténué postérieurement, brillant, noir en dessous; dessus jaune paille avec des points bruns et des dessins foncés variés, membres bicolores. Tête ponctuée, pubescente de blanc, noire en arrière, jaune en avant, yeux assez rapprochés; antennes noires, à base testacée, pas très longues, assez grêles; prothorax court, rétréci en avant, nettement ponctué avec des points irrégulièrement placés, cerclés de brun, une bande longitudinale médiane et une autre transversale prolongée en arrière, aux extrémités, ou encerclant un point jaune, celles-ci noires; écusson noir, allongé; élytres courts, à rangées rapprochées de points forts, à fond brunâtre, en partie ridés en travers, ornés de deux ou trois macules allongées noires à la base et marquées, avant l'extrémité, de traits noirs larges irréguliers et en partie joints; dessous du corps foncé, densément pubescent de blanc, pygidium un peu roussâtre, pattes bicolores, peu robustes. Long. 4 millim.

Ambovombé, Tsitevemnekis, oct. 1900 (D^r J. Decorse).

Espèce de forme et structure particulière pouvant se placer près de *C. Antonii* Clav.

Cryptocephalus multiplicatus nov. sp.

Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, thorace brunneo vittato et elytris vage brunneo maculatis.

Oblong, brillant, roux-testacé avec le prothorax orné d'une bande brune médiane large et sinuée, prolongée en arrière au milieu et aux extrémités, élytres à macules antérieures et postérieures brunes peu indiquées. Tête peu ponctuée, yeux écartés; antennes grêles; prothorax court, rétréci en avant, peu ponctué; écusson court et large; élytres peu courts, à rangées de points forts, rapprochées, substriés par places avec de nombreux plis transversaux; dessous du corps éparsément pubescent de gris; pattes longues et assez grêles. Long. 5 millim.

Majunga (ex-collection Fairmaire).

Ressemble un peu à *C. depressicornis* Pic, mais antennes grêles, forme plus parallèle avec les élytres ornés de nombreux plis transversaux.

Cryptocephalus Descarpentriesi nov. sp.

Oblongo-ovatus, convexus, nitidus, niger, capite rufo, thorace rufo, transverse nigro fuscato, elytris nigris, lateraliter et apice late testaceo limbatis, ad basin et in disco rufo maculatis.

Oblong-ovalaire, convexe, brillant, noir avec le dessus roux et noir. Tête rousse, ponctuée, subsillonnée, yeux distants; antennes noires à base testacée; prothorax court, rétréci en avant, à ponctuation fine, écartée, orné d'une bande transversale médiane raccourcie noire, base bordée de foncé; écusson grand, triangulaire, noir taché de roux; élytres courts avec des rangées de petits points espacés, s'effaçant en arrière, intervalles larges et déprimés; dessous du corps peu pubescent; pattes peu robustes. Long. 4,5 millim.

Vallée de la Marimbong. région de Soanieralia, 1907 (J. Descarpentries).

Peut se placer près de *C. parenthesis* Dohr., plus convexe, moins rétréci en arrière avec des dessins très différents.

Cryptocephalus triluteomaculatus nov. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, ruber, elytris in disco piceis et luteo trimaculatis, antennis nigris, ad basin testaceis, pedibus testaceis, tarsis piceis.

Oblong-allongé, brillant, rouge avec le disque des élytres plus foncé et orné de 3 grosses macules jaunes disposées en série longitudinale, base des antennes et pattes testacées, tarses de poix. Tête à ponctuation rugueuse, dense, yeux écartés; antennes courtes et grêles; écusson triangulaire, foncé; élytres assez longs, avec quelques rangées de points, en partie petits et des stries présuturale et latérale; dessous du corps peu densément pubescent de gris; pattes pas très robustes. Long: 5 millim.

Ambovombé, mars 1901 (Dr J. Decorse).

Plus grand, plus allongé que le précédent, élytres dépourvus de bordure jaune et d'ailleurs très caractérisé par son système de coloration.

Cryptocephalus Lantzi nov. sp.

Robustus, sat latus, postice valde attenuatus, nitidus, rufus, pectore lateraliter nigro, supra luteus, fasciis nigris, undulatis ornatus.

Robuste, assez large, très atténué en arrière, brillant, roux en dessous avec les côtés de la poitrine noir-jaune, en dessus avec des fascies ondulées

noires. Tête éparsément ponctuée avec un point noir postérieur, yeux écartés; antennes rousses à la base (le reste manque); prothorax court et large, rétréci en avant, à double ponctuation distincte, orné des dessins noirs suivants : une fascie basale, prolongée en avant au milieu, en encadrant une macule jaune et bifide en avant, une macule médiane latérale; écusson grand, triangulaire, noir; élytres très larges en avant et courts, à rangées écartées de points fins avec les intervalles larges, bordés de noir postérieurement, plus largement sur la suture avec deux fascies transversales ondulées noires, une avant, l'autre après le milieu; dessous du corps peu pubescent; pattes rousses, grêles. Long. 6 millim.

Côte ouest de Madagascar, 1882 (Lantz).

Espèce très distincte par sa forme jointe à sa coloration, se rapproche de *C. pustulatus* F., de l'Afrique Australe.

Cryptocephalus singularipennis nov. sp.

Oblongus, nitidus, rufo-brunneus, signaturis luteis ornatus, membris luteis.

Oblong, brillant, roux-brunâtre, orné de dessins jaunes, membres jaunes. Tête rousse, fortement ponctuée, yeux écartés; antennes grêles; prothorax bombé, assez court, rétréci en avant, subalutacé avec de petits points écartés, cet organe roux est bordé de jaune, la bordure, étant ondulée latéralement, émet une linéole médiane, en outre une macule allongée, également jaune, de chaque côté de la base; écusson triangulaire; élytres courts, à rangées de points substriés bruns placés dans de faibles stries, bordés de jaune à la base et ornés, en outre, de nombreuses lignes antérieures juxtaposées jaunes, les internes plus courtes et de traits postérieurs transversaux et longitudinaux en partie joints, également jaunes; dessous du corps peu pubescent; pattes jaunes, marquées de brun. Long. 4 millim.

Ambovambo, Déc. 1900 (D^r J. Decorse).

Par son système de coloration rappelle certaines espèces américaines par exemple : *C. formosus* Mels. Espèce très distincte parmi celles de Madagascar.

Cryptocephalus multiundulatus nov. sp.

Oblongus, postice attenuatus, convexus, nitidus, luteus, thorace elytrisque nigro undulato-fasciatis, pedibus nigro maculatis.

Oblong, convexe, brillant, peu pubescent en dessous, roux, plutôt jaune en dessus et ondulé de noir, membres testacés avec les pattes maculées de noir. Tête à ponctuation écartée, jaune avec une macule postérieure

noire, yeux écartés; antennes un peu épaissies à l'extrémité; prothorax court et large, atténué en avant, à ponctuation médiocre, écartée, jaune, orné des dessins noirs suivants : quatre bandes longitudinales ondulées, les externes émettant une branche latérale médiane et encerclant un point jaune, en outre une macule médiane isolée; écusson jaune, allongé, triangulaire; élytres assez courts, atténués postérieurement, à rangées de points médiocres en partie effacés et intervalles larges, jaunes, ornés des dessins noirs suivants : quatre fascies transversales ondulées, dont une antéapicale courte, jointes sur les côtés par une étroite bordure, en partie et diversement jointes aussi sur le disque et deux à deux, celles-ci rarement un peu interrompues, la fascie antérieure est arquée en avant sur les épaules et vers l'écusson; pattes pas très robustes, claires, diversement maculées de foncé. Long. 4-4,5 millim.

Ambovombé 1901 (D^r J. Decorse).

Voisin de *C. fractiscriptus* Frm., s'en distingue, à première vue, par les fascies ondulées des élytres complètes, ou presque, avec une fascie antéapicale, au lieu d'une macule isolée.

***Cryptocephalus Gaudroni* nov. sp.**

Parum latus, postice attenuatus, nitidus, rufo-purpureus, antennis apice, scutello, pectore, tibiis apice tarsisque nigris, elytris ad basin et apice nigro marginatis.

Un peu large, atténué postérieurement, brillant, roux-pourpré avec partie des membres, écusson et poitrine noirs, élytres bordés étroitement de noir à la base et plus étroitement encore au sommet. Tête peu ponctuée, yeux distants; antennes un peu élargies à l'extrémité; prothorax court, très rétréci en avant, finement ponctué; écusson long et étroit; élytres courts, à rangées de points médiocres, sans stries apparentes, intervalles larges; dessous du corps pubescent de gris; pattes assez grêles. Long. 6 millim.

Androka, région de Tulear, 19:3 (Lieutenant Gaudron).

Voisin de *C. piceorufus* Frm., en diffère par les élytres bordés de foncé aux deux extrémités, les pattes bicolores, etc.